

Interpretazione delle indicazioni di offerta del calendario

Nota Bene: i mesi e gli anni di vita si intendono compiuti. Esempi: la prima dose DTaP-IPV-HBV-Hib può essere offerta a partire da 2 mesi compiuti, ovvero a partire dal 61° giorno di vita; la dose di richiamo DTaP-IPV-HBV-Hib a 10 mesi, ovvero a partire dal 301° giorno di vita, ecc.

1. RV: Ciclo vaccinale a 2 o 3 dosi in base al vaccino utilizzato, a partire dalla 6^a settimana di vita e da completarsi entro le 24 o 32 settimane di vita a seconda del prodotto utilizzato.
2. PCV: Ciclo vaccinale a 3 o 4 dosi in base al vaccino utilizzato, a partire dalla 6^a settimana di vita.
3. PCV: offrire alla coorte dei 65enni con chiamata attiva PCV20; recupero dei soggetti che hanno compiuto 65 anni a partire dal 2017 (nati nel 1952) con offerta gratuita su richiesta.
4. MenB: È raccomandato somministrare la prima dose di vaccino a partire dai 2 mesi di vita compiuti in co-somministrazione con i vaccini esavalente, antipneumococcico e rotavirus. La seconda dose può essere somministrata dopo almeno due mesi e il richiamo nel secondo anno di vita ad almeno sei mesi dal ciclo primario.
5. Men B: offerto attivamente e gratuitamente alla coorte degli undicenni (a partire dai nati nel 2013) in co-somministrazione con il vaccino per il papilloma virus HPV.
6. MPRV- MPR-V: Prima dose a 12 mesi compiuti. I bambini che hanno ricevuto una dose di vaccino MPR prima del loro primo compleanno devono ricevere altre due dosi (una dose a 12-15 mesi di età e un'altra dose separata da almeno 28 giorni).
7. MenACWY: ad almeno 12 mesi compiuti.
8. a - HPV: 2 o 3 dosi in base all'età.
b - La vaccinazione di recupero (catch up), è raccomandata per le donne, a partire dalla coorte di nascita del 1996, fino a 30 anni compiuti (29 anni e 364 giorni) anche utilizzando l'occasione opportuna della chiamata al primo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero, e per gli uomini, a partire dalla coorte di nascita del 2006, fino a 26 anni (25 anni e 364 giorni), qualora non siano stati precedentemente vaccinati o non abbiano completato il ciclo vaccinale.
9. dTpa: 1 dose ogni 10 anni.
10. FLU: si vedano le raccomandazioni fornite annualmente con circolare del Ministero della Salute.
11. HZV: vaccino ricombinante adiuvato (RZV) somministrato in due dosi a distanza di due mesi, e non più di sei; offrire alla coorte dei 65enni con chiamata attiva; recupero dei soggetti che hanno compiuto 65 anni a partire dal 2017 (nati nel 1952) con offerta gratuita su richiesta.